

Disbioza colonului - Profil boli cronice intestinale SBY3

Bolile cronice inflamatorii intestinale, precum colita ulcerativă și boala Crohn, combină o predispoziție genetică cu disbioză și cu dereglări imune, care produc tulburarea permeabilității intestinale și efecte toxice. Stresul și nutriția sunt factori la fel de importanți. Se asociază frecvent cu boli imune ale sistemului osos și cu osteoporoza. Diagnosticul trebuie confirmat prin colonoscopie cu biopsie, dar celelalte teste contribuie la diferențierea de sindromul colonului iritabil. Nivelurile foarte crescute de lactoferină și calprotectină arată gradul de recurență. Analiza parametrilor de permeabilitate și statusul microbiotei intestinale sunt un diagnostic suplimentar valoros.

Ce analize include testul:

- ✓ Statusul microbiotei intestinale
- ✓ Alfa 1 antitripsina
- ✓ Elastaza pancreatică
- ✓ Calprotectina
- ✓ EPX (proteina eozinofilică în scaun)
- ✓ pH

Materiale necesare pentru efectuarea testului:

- ✓ Două recipiente de colectare
- ✓ Formular special de cerere
- ✓ Spatule de lemn
- ✓ Mănuși de latex
- ✓ Hârtie de colectare Fe-Col

Proba de analizat:

- ✓ Pentru analiza **Disbioza colonului – profil boli cronice intestinale**, se recoltează în două recipiente prevăzute cu spatule (coprorecoltoare), probe de materii fecale de câte 5 g fiecare (3 spatule/recipient).



Vă recomandăm să țineți cont de considerațiile și instrucțiunile de mai jos:

Considerații pre-colectare:


- ✓ Cu 8 zile înainte de recoltarea probei, nu luați antibiotice sau antihistaminice.
- ✓ Dieta nu este necesară.
- ✓ Cu 2-3 zile înainte de colectare, intrerupeți administrarea de probiotice.

Instrucțiuni de colectare a probei


Colectarea probelor de scaun:



1. Plasați hârtia Fe-Col pe toaletă, așa cum este indicat în instrucțiunile Fe-Col. Folosiți cu prudență în cazul scaunelor apoase (diareice), deoarece hârtia se poate rupe. Evitați contaminarea probei cu apă sau urină. Folosiți mănuși de latex.



2. Deschideți unul din coprorecoltoare. Cu ajutorul spatulei, colectați proba de scaun de 5 g (3 spatule/recipient). Treceți numele dumneavoastră pe recipient, împreună cu data colectării. Faceți la fel și pentru cel de-al doilea coprorecoltor.



3. Recipientele trebuie aduse la laborator cât mai repede după recoltare. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci probele se vor păstra la rece, un recipient la frigider (4-6°C), iar celălalt la congelator (-20 °C), apoi se vor aduce la laborator.

Etaple de urmat:

1



Asigurați-vă că aveți toate materialele din lista "Materiale necesare pentru efectuarea testului".

2



Citiți cu atenție și urmați întocmai "Considerațiile pre-colectare" și "Instrucțiunile de colectare", pentru a obține probe corespunzătoare. Puneți coprorecoltoarele în punguța pentru probe și sigilați-o. Completați Formularul de Cerere și semnați-l înainte de a-l pune în kit. Trimiteți proba în maximum 24 de ore la cel mai apropiat centru SYNLAB.

3



Rezultatul va fi trimis către dumneavoastră după 22 de zile lucrătoare.